

La Morpholiposculpture (MLS)

La MLS est une méthode non chirurgicale permettant :

- le traitement de la cellulite;
- l'élimination radicale des bourrelets graisseux disgracieux quelle que soit leur localisation, du menton à la cheville;
- corriger les défauts de la silhouette.

Cette technique présente l'avantage d'éviter l'aspiration de graisse et donc d'obtenir un modelage uniforme de la zone traitée (sans creux, ni vagues).

Le **principe du traitement** consiste en l'injection d'une solution hypo-osmolaire suivie de l'application d'ultrasons afin d'obtenir une destruction chimio-mécanique localisée des adipocytes (cellules graisseuses) et une remise en tension musculo-cutanée.

En pratique, il s'agit d'un traitement personnalisé, adapté à la zone à traiter et au type de graisse.

Il comprend les étapes suivantes :

- Un questionnaire médical complet et mesures précises des amas graisseux;
- Une cryopréparation cutanée afin d'anesthésier les tissus et d'obtenir une vasoconstriction;
- Une injection de liquide hypo-osmolaire de volume variable suivant la zone à traiter (toujours inférieur à 500 ml), contenant du sérum physiologique, de l'eau stérile et un anesthésique, la xylocaïne. Le passage de cette solution dans les adipocytes facilite leur destruction
- Introduction indolore dans le bourrelet graisseux d'une sonde à bout mousse transmettant des ultrasons de faible puissance amplifiant la destruction mécanique des adipocytes;
- Application cutanée sur toute la zone traitée d'ultrasons, ondes vibratoires fragilisant aussi la membrane des adipocytes et leur éclatement, améliorant le drainage veino-lymphatique et la tonification musculaire.

En outre, **un morphodrainage** peut être effectué par application d'ondes électromagnétiques dans le but d'accélérer l'évacuation des adipocytes et l'élimination des exsudats par voie lymphatique.

Selon la taille des rondeurs, le nombre de séances est variable. En moyenne, 3 à 4 séances espacées de 4 à 6 semaines.

Les suites du traitement

Une contention de la zone traitée est recommandée pendant trois jours (gaine, lipopanty, ceinture abdominale,...)

Un léger œdème peut persister pendant 24 heures, les ecchymoses sont rares.

Il n'y a pas d'éviction sociale.

Les résultats sont définitifs.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements personnalisés.